## QUELS VACCINS (population générale) ?

2 mois	3 mois	4 mois	5 mois	11 mois	12 mois	16 mois	24 mois	6 ans	11 ans	12 ans	25 ans	45 ans	65 ans	75 ans
		BCG en f	onction fa	acteurs de ris	que									
HEXA		HEXA		HEXA				DTCaP	dTcaP		dTcaP	dTP	dTP	dTP
Prevenar13		Prevenar13		Prevenar13										
			Neisvac		MenC	Rat	trapage (-	-> <b>24</b> an	s)	MenACWY				
					ROR	ROR	Ratt	trapage	(2 injec	tions si nés d	lepuis 19	80)		
				Hepatite B	Rattrapage	e (> <b>15</b> a	ns ou fact	eur de r	isque)					
									Gardas	sil 9*> 19 - 2	26 ans			
Rotavirus	RotaV	RotaV			Hép A		Hép A							
	Bexsero		Bexsero			Bexsero				Bexsero 15 ans				
					Varicelle		Varicelle			Zona Varicelle > 50an  **		> <b>50</b> ans	Grippe saisonnière	
Obligatoire	s enft nés	depuis 2018	* Gardas	il 9: (2 inj>:	15 ans, 3 in	j. 15 à 19 a	ns). Garço	ons HSH	> <b>2</b> 6 a	ins				
Recomman	dés et ren	nboursés												
Conseillés,	NR sauf +	/-mutu												

Vaccins obligatoires pour tous les enfants nés depuis janvier 2018					
Age	Maladies	Vaccins ®	Nbre injections		
2 et 4 mois	Vaccins « Hexa » Diphtérie-Tétanos-Polio-Haemophilus-Coqueluche-Hépatite B	Hexyon® Infanrix Hexa® Vaxelis®	2 injections : 1 dans chaque cuisse, vaste externe du		
	Pneumocoque (Méningites, infections invasives, Pneumonies, Otites	Prevenar 13®	quadriceps		
5 mois	Méningocoque C (Méningites)	Neisvac®	1 injection (cuisse)		
11 mois	Les mêmes qu'à 2 et 4 mois		1 injection dans cuisses ou chaque bras (deltoide)		
12 mois	Rougeole – Oreillons - Rubéole	Priorix <sup>®</sup> MMRVax <sup>®</sup>	2 injections dans		
	Méningocoque C (Méningites)	Neisvac® Menjugate®	cuisses ou bras		
16 – 18 mois	Rougeole – Oreillons - Rubéole	Priorix® MMRVax®	1 injection dans bras		
6 et 11 ans	Diphtérie – Tétanos – Polio-Coqueluche DTCaP	Tetravac®	idem		

Vaccins fortement recommandés et remboursés						
Age	Maladies	Vaccins	Nbre injections			
11-15 ans	Infections à papillomavirus filles et	Gardasil 9®	11-15 ans : 2 inj à 6 mois d'intervalle			
Rattrapage jusqu'à 19 ans, 26 ans	garçons (cancers du col, de la gorge, de		>15 ans : 2inj à 2mois d'I +1 rappel 6 mois ou			
pour garçons HSH	l'anus et du gland		plus après			
12m – 15 ans	Hépatite B (si non fait avec Hexa)	Engerix B10	2 inj. puis rappel			
		HBvax pro5				
		Engerix B20	2 inj à 6 mois (entre 12 et 15 ans)			
12 ans	Varicelle, si ne l'a pas encore faite	Varivax®	2 inj. A au moins 2 mois d'intervalle			
		Varilrix®				

Vaccins non obligatoires mais conseillés (non remboursés sauf certaines mutuelles)							
Age	Maladies	Vaccins	Nbre injections	Prix conseillé/dose			
2-3 mois	Gastro entérite à Rotavirus	Rotateq®	3 prises orales	45€			
		Rotarix®	2 prises orales	65€			
3-5 mois et rappel > 1 an	Méningites à Méningocoque B	Bexsero®	2 + 1 Injections	83,90€			
15 ans			2 inj				
12-15 ans	Méningites Meningo ACWY	Nimenrix®	1 injection	40,50			
		Menveo®					
>1 an	Varicelle	Varivax®	2 injections	37.20€			
		Varilrix®					
>1 an	Hépatite A	Havrix	2 inj à 6 mois	13.59€ enfant			
				20,71€ adulte			

Vaccins Adultes					
Age	Maladies	Vaccins			
25 ans, cocooning,	Diphtérie-Tétanos-Polio-Coqueluche	Boostrix®			
grossesse (début 3eme trim)	dTcaP	Repevax®			
45 – 65- 75 ans puis tous	Diphterie-Tétanos-Polio :	Revaxis®			
les 10 ans	dTP				
Nés depuis 1980	ROR x 2 dans leur vie	Priorix®			
		MMRvax®			
50 ans et plus	**Zona remboursé si > 65 ans	Zostavax®			
65 ans et f de risque	Grippe saisonnière	Vaccins			
		Tetra			
Suivant terrain et f de Pneumocoque : Prevenar 13 puis Pneumovax 8 sem aprèrisque					

Pour Infovac, F Vié le Sage